

## بررسی میزان شیوع بیماران همی پلژیا در مراجعه کنندگان به مرکز

### بهبیستی شیراز در شش ماهه اول سال ۸۷

منصوره محمدپور<sup>۱</sup>، معصومه محمدپور<sup>۲</sup>، مرضیه محمدپور<sup>۳</sup>

**مقدمه و هدف:** سکنه دربردارنده نشانه های ناگهانی ناشی از اختلال موضعی در کار مغز است که باعث نکرور بافت مغزی شود بنابراین برگشت کامل وجود نخواهد داشت علت سکنه مغزی در رگهای مغزی و خونرسانی مغز می باشد یکی از عوارض مهم سکنه مغزی ، همی پلژیا یا فلج نیمه بدن است که پس از درمان علل زمینه ای توسط پزشک ، بیمار مبتلا به این عارضه باید تحت نظر فیزیوتراپیست قرار گرفته و درمان گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع بیماران همی پلژیا در مراجعه کنندگان به مرکز بهبودی شیراز در شش ماهه اول سال ۸۶ بوده است.

**روش تحقیق:** این مطالعه به روش مقطعی-توصیفی بر روی تمام بیماران مراجعه کننده به مرکز توانبخشی فتح المبین شیراز در شش ماهه اول سال ۸۶ و حدود ۴۶۴ پرونده انجام گردید اطلاعات لازم بر مبنای مرور پرونده های ثبت شده در بایگانی مرکز بهبودی شیراز و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید متغیرهای مورد بررسی شامل جنس، سن و زمان مراجعه بر حسب ماه، و بیماران همی پلژیا بوده است. معیار ورود به مطالعه بیماران همی پلژیا بود که اطلاعات بصورت محرمانه در پرسشنامه درج و موارد ناقص حذف گردید و با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی دسته بندی شد.

**نتایج:** با توجه به پرونده های مورد بررسی نتایج زیر حاصل شد: از تعداد کل ۴۶۴ پرونده ۲۶۰ پرونده دچار معلولیت گزارش شده بود که از این تعداد ۶۶ نفر دچار همی پلژیا بودند که ۱۳/۷ درصد مونث و ۱۶/۸ مذکر و بیشترین سن مراجعه کننده ۵۰ سال به بالا ۷۱ درصد گزارش شده است و خرداد ماه با ۲۷ درصد و مرداد ماه با ۲۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مراجعه کننده را داشته است.

**نتیجه گیری:** با توجه به بررسی انجام شده مشخص می شود با بالا رفتن سن میزان بروز عارضه همی پلژیا در حال افزایش است درمان مبتلایان به همی پلژیا ، نیاز به همکاری متخصصین مختلف از جمله: پزشک، فیزیوتراپیست، پرستار و... دارد و برای اینکه نتیجه رضایتبخشی از درمان حاصل شود باید اعضای این تیم درمانی با هم مشورت کرده و برنامه درمانی هماهنگی را پی ریزی کنند همچنین آگاهی خانواده ها از اصول مراقبت اینگونه بیماران ضروری است .

**کلمات کلیدی:** همی پلژیا ، بهبودی، فیزیوتراپی، شیراز

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲- دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۳- دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد